

ペキサロンTMフロアブル

PyraxaltTM active

水稲育苗箱専用殺虫剤

- ウンカ類に対し、移植後最大90日程度の残効性。
- 抵抗性ウンカに対しても安定した効果を発揮。
- 動力噴霧器を用いれば、およそ1ha分の育苗箱(200枚)を約5分で処理可能。



トビイロウンカ



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



ツマグロヨコバイ

池田二三高氏 撮影

ウンカ防除を
もっとスピーディに!

水稲育苗箱専用殺虫剤

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類	140倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当たり0.5ℓ	は種時(覆土前) ～移植当日	1回	灌注	1回
	ツマグロヨコバイ		育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当たり0.5ℓ	は種時(覆土前)			

灌注処理の上手な使い方

効果を安定させるため、薬剤処理の直前・直後の多量の灌水は避け、苗箱に十分薬液を吸わせるようにしてください。

【1】希釈液を作る

水140ℓ
本剤1ℓ


水140ℓに本剤1ℓを入れ、よく溶かします

【2】育苗箱の上から均一に灌注

育苗箱1枚あたりの
処理量は500mlです

【3】移植

トビイロウンカに対する効果



使用上の注意事項

- 本剤は懸濁性液体なので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
- 空容器、空瓶等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密封して保管してください。

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

製造

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー

<https://www.corteva.jp/>



取扱

本資料は2023年1月現在の知見に基づき、作成されています。