

ファルコン™フロアブル

園芸用殺虫剤

ファルコンフロアブルは、チョウ目害虫に脱皮促進作用を示し、すぐれた速効性を発揮します。



① 脱皮促進作用 2～3日後には致死。

本剤は幼虫の脱皮を急激に促進させます。幼虫は成長が追いつかず脱皮失敗で死亡します。

② 食害防止作用 10数時間後にはストップ。

成分が体内に入ると、幼虫の生理状態は脱皮間近の状態に変わり食害が止まります。



ユニークな、
ファルコンの効果。

適用害虫と使用方法


処理方法：散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り散布液量(ℓ)	使用時期*	総使用回数*
キャベツ	コナガ	1,000	150~300	7日	2回
	アオムシ、ヨトウムシ	2,000~4,000			
	ハスモンヨトウ				
	タマナギンウワバ				
	オオタバコガ	2,000	100~300	3日	3回
はくさい	アオムシ、ヨトウムシ				
だいこん	アオムシ、ヨトウムシ				
ブロッコリー	ハスモンヨトウ				
はなっこりー	ハスモンヨトウ	2,000~4,000	150~300	前日	2回
レタス	ハスモンヨトウ				
非結球レタス	オオタバコガ				
ふき	ハスモンヨトウ				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	4,000	150~200	前日	3回
いちご	ハスモンヨトウ				
	オオタバコガ				
かんしょ	ハスモンヨトウ				
	ナカジロシタバ	4,000~6,000	100~300	3日	2回
ピーマン	ハスモンヨトウ				
なす	オオタバコガ				
トマト	オオタバコガ				
ししとう	ハスモンヨトウ	4,000	100~150	前日	2回
	オオタバコガ				
はすいも(葉柄)	ハスモンヨトウ	4,000	150~180	3日	7日
つるな	ハスモンヨトウ				
食用ぎく	ハスモンヨトウ				
食用金魚草	ハスモンヨトウ				
食用なでしこ	ハスモンヨトウ				
てんさい	ヨトウムシ				
りんご	ハマキムシ類	4,000~6,000	200~700	21日	3回
	ケムシ類、ヨモギエダシヤク				
	キンモンホソガ				
おうとう、もも	ハマキムシ類	6,000	200~400	3日	2回
なし	ケムシ類、ハマキムシ類				
茶	チャハマキ	4,000~8,000	200~400	摘採7日	2回
	チャノホソガ				
	チャノコカクモンハマキ				
	ヨモギエダシヤク				
	ハスモンヨトウ	8,000			

※収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びメトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

中老齢幼虫にも活性が高い


ヨトウムシに対する効果 (2000年 社内試験)



てんさい新葉の薬液浸漬法(30秒間)。7日目の死虫数にて計算。

齢のすすんだ幼虫がいなくなる


ハスモンヨトウに対する効果 (1999年 高知県農業技術センター)



作物：ピーマン(ビニールハウス、定植：9月27日)
発生量：10月28日に2、3齢幼虫を接種 散布月日：10月29日(栽培初期)

残効性があり、耐雨性に優れる

タマナギンウワバに対する効果 (2001年 岩手県農業研究センター)



作物：キャベツ(定植：6月16日) 散布月日：7月10日(結球初期)

有用昆虫に影響が少ない

ミツバチ、マルハナバチなどの受粉昆虫や、幅広い天敵に対して実用濃度で影響がないことが確認されています。

◎ファルコンの影響がないことが確認されている有用昆虫

受粉昆虫天敵類

- セイヨウミツバチ ●マメコバチ ●ツチマルハナバチ (マルハナバチの一種、主に受粉に利用されている種類)
- カタグロミドリカスミカメ ●ズイムシアカタマゴバチ ●ケナガカブリダニ ●オオヒメグモ
- アシナガグモ ●チリカブリダニ ●ヒメハナカメムシ ●コレマンアブラバチ
- オンシツツヤコバチ ●ナミテントウ ●ハモグリミドリヒメコバチ ●イサエアヒメコバチ

△ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

△ 安全使用上の注意

- 散布の際は保護メガネ、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

製造販売

ダウ・アグロサイエンス日本株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー

https://www.corteva.jp/



取扱

本資料は2019年9月現在の知見に基づき、作成されています。