

デビューTM乳剤

畑作用殺菌剤

北海道畑作の病害防除に！

てんさいの褐斑病、葉腐病のほかに、玉ねぎの灰色カビ病、小菌核病に優れた効果を発揮します。



4つの“力”で 病害と戦う！

「浸透力」「治療力」「残効力」「予防力」の4つの力で、優れた病害防除効果を発揮します。

畠作用殺菌剤 てんさい・たまねぎの病害防除に デビュー™ 乳剤

■登録番号:第22400号
 ■有効成分:フェンブコナゾール…12.5%
 ■性状:黄色透明可乳化油状液体
 ■有効年限:4年
 ■包装:2ℓ、5ℓ
 ■殺菌剤分類:3

■適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病・葉腐病	800~1,000	100~200ℓ	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	褐斑病	200	25ℓ				2回以内
小麦	雪腐小粒菌核病	500~1,000	60~150ℓ	根雪前	2回以内	散布	4回以内
	だいす	紫斑病	800~1,000	収穫7日前まで	4回以内		3回以内
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	800倍	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内		

■病害と戦うデビュー乳剤4つの“力”

デビューア有效成分は、糸状菌の細胞膜の重要な物質エルゴステロールの生合成を阻害する作用を有します(EBI剤、または、DMI剤に分類)。てんさい・たまねぎの病害防除には次の4つの力が合わさり、優れた防除効果が発揮されます。



浸透力とは、有効成分が茎葉の内部まで入っていく力です。デビューアの有効成分は、速やかに植物組織内に浸透するので、耐雨性に優れ、また、植物体内に既に侵入した病原菌(初期感染時)にも効力を発揮します。



治療力とは、作物が病気に既に感染してしまった後でも、植物体内に入り込んだ病原菌を死滅させたり、活動を停止させてしまう力です。治療力があると、適期散布できる期間が広がり、散布タイミングに余裕が持てます。




残効力とは、散布された有効成分が長い期間にわたって病害防除効果を発揮する力です。デビューアの有効成分は、植物体内に浸透し、長期間病原菌の侵入を抑制しますので、余裕を持った散布計画が立てられます。



予防力とは、作物を病害の感染から守る力です。てんさい褐斑病などでは、一度、病気が発生すると、病斑上に胞子ができ、次から次に感染が繰り返されますので、優れた予防力を持った薬剤の選択が重要です。


てんさい



褐斑病/防除効果試験

(2005年 北海道植物防疫協会)

- 試験場所／北海道網走郡
- 供試品種／アセンド(移植:5月20日)
- 病害発生／接種7月15日
多発生(無処理区発病度68.9)
- 初発／8月5日
- 薬剤処理／8月12日、8月26日 2回散布
- 調査日／8月11日、8月17日、8月24日、9月2日、9月9日




葉腐病/防除効果試験

(2007年 北海道植物防疫協会)

- 試験場所／北海道網走郡
- 供試品種／アセンド(移植:5月11日)
- 病害発生／接種7月17日および8月8日
少発生(無処理区発病度15.6)
- 初発／8月7日
- 薬剤処理／8月10日、8月28日 2回散布
- 調査日／9月4日、9月12日


たまねぎ



小菌核病/防除効果試験

(2009年 北海道植物防疫協会)

- 試験場所／北海道富良野市
- 供試品種／北もみじ2000(定植:5月1日)
- 病害発生／甚発生
- 初発／7月1日
- 薬剤処理／6月26日、7月3日、7月11日、7月17日、7月23日 5回散布
- 調査日／7月30日



灰色かび病/防除効果試験

(2009年 日本植物防疫協会研究所)

- 試験場所／千葉県山武市
- 供試品種／O-P黄(定植:11月20日)
- 病害発生／多発生
- 初発／5月中旬
- 薬剤処理／4月15日、4月22日、4月30日、5月12日、5月20日 5回散布
- 調査日／5月28日



⚠ 使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- てんさいに対して希釈倍数200倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。

- 使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

製造

コルテバ・ジャパン株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー

<https://www.corteva.jp/>

取扱

◎本資料は2022年11月現在の知見に基づき、作成されています。