

デリゲート™ WDG

園芸用殺虫剤

問題害虫から大切な作物を守り、豊かな実りを支えます。

- ・広い殺虫スペクトラム
- ・ハマキムシ類に優れた効果
- ・収穫前日まで使用可能



“デリケート”な果物だからこそ、
虫から守りたい。

広い殺虫スペクトラム

チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し、防除効果を発揮します。

ハマキムシ類に優れた効果

各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対し、防除効果を発揮します。

収穫前日まで使用可能

適用害虫と使用方法

*本剤及びスピネトラムを含む農薬の総使用回数

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	希釈液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5,000~10,000	5,000~10,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ	5,000~15,000				
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類					
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類					
かき	アザミウマ類 ハマキムシ類 カキノヘタムシガ					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類					
うめ	ケムシ類					
すもも	シンクイムシ類	5,000				
ぶどう	ハスモンヨトウ	10,000				
	アザミウマ類 ハマキムシ類					
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類	5,000~10,000				
	ハスモンヨトウ	10,000				
いちじく	アザミウマ類	5,000				
	ショウジョウバエ類	10,000				
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ					
くり	モモノゴマダラノメイガ	10,000				
さんしょう(果実)	アザミウマ類	5,000~10,000				
アロニア	シンクイムシ類	10,000				

⚠ 使用上の注意



- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤の使用に当っては、用量・使用時期・使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。

●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

①ミツバチの巣箱およびその周辺にかかるないようにしてください。

②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさせてください。

③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

製造販売

ダウ・アグロサイエンス日本株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー

<https://www.corteva.jp/>

取扱

本資料は2019年11月現在の知見に基づき、作成されています。