

ダブルシューター™ SE

園芸用殺虫剤

ダブルの力で、なす・トマト・ミニトマトの主要害虫をこの1剤が防除！

- ・天然物由来の2成分を配合した殺虫剤。
- ・コナジラミ類の全ステージ(卵・幼虫・成虫)に優れた効果。
- ・薬剤感受性が低下したハダニ類にも有効。
- ・トマト、ミニトマト、ナスのアザミウマ類・オオタバコガに適用拡大！
- ・花き類、観葉植物のアザミウマ類・ハダニ類に適用拡大！



コナジラミ類を
発生させない、
増やさない！

ハダニ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類・
オオタバコガ対策にもおすすめ！

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む 農薬の総使用回数	スピノサドを含む 農薬の総使用回数
なす	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ	1,000倍	100～ 300ℓ/10a	収穫 前日まで	2回以内	散布	—	2回以内
トマト ミニトマト	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ							
花き類・観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類			発生初期				

殺虫スペクトラム

◎：優れた効果がある ○：効果がある

分類	ダニ目		カメムシ目		アザミウマ目	チョウ目	ハエ目	
害虫名	ナミハダニ	カンザワハダニ	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ	アザミウマ類※	オオタバコガ	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ
効果	○～◎	○～◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ネギアザミウマ、クロゲハナアザミウマ

製剤のはたらき




有効成分（スピノサド・脂肪酸グリセリド）単独使用では低活性の害虫も**2成分の相乗効果**で優れた活性を示します。

（スピノサド）害虫の神経伝達系をかく乱することにより害虫の筋肉に痙攣を引き起こし衰弱させ、最終的に殺虫作用を示します。


（脂肪酸グリセリド）害虫の体表面を油膜により被覆することで主に物理的に気門封鎖し、窒息死させたりします。

●コナジラミ類に対する防除効果試験



- 試験場所：サンケイ化学(株)研究部
- 作物名：なす(千両二号)
- 対象害虫：オンシツコナジラミ
- 試験方法：オンシツコナジラミ成虫放虫試験
- 調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布3日後、7日後、14日後の成虫及び幼虫数を調査。
- 処理日：2016年6月23日

●ハダニ類に対する防除効果試験



- 試験場所：サンケイ化学(株)研究部
- 作物名：なす(千両二号)
- 対象害虫：ナミハダニ
- 試験方法：ナミハダニ雌成虫放虫試験
- 調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布2日後、4日後、7日後、14日後、21日後の雌成虫数を調査。
- 処理日：2014年3月13日

⚠ 使用上の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布すること。
- キャブタン水和剤およびストロビルリン系薬剤との同時施用及び近接散布は薬害を生じる恐れがあるので避けること。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着する恐れがある場所では使用しないこと。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等での使用を避けること。
 - ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
- 作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

製造販売

ダウ・アグロサイエンス日本株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー

<https://www.corteva.jp/>



取扱

本資料は2019年6月現在の知見に基づき、作成されています。