

クリンチャー™ EW

水稲用除草剤

無人航空機で 散布する際の注意



クリンチャーEWを無人航空機で散布する際は、以下の点に特にご注意ください。

- ① 散布機種の使用基準に従って実施する。
- ② 散布機種に適合した散布装置を使用する。
- ③ 作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行う。
- ④ 周辺に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わない。
- ⑤ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意する。
- ⑥ 薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- ⑦ 本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しない。
- ⑧ 散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布する。



写真はイメージです。

上手な使い方

- ① ノビエ4.5葉期までに散布してください。
- ② 展着剤を加用してください。
- ③ 雑草茎葉にかかるように散布してください。
- ④ まきむらのないよう均一に散布してください。
- ⑤ 乾燥が続いた条件では使用しないでください。

■適用雑草と使用方法

※本剤及びシハロホップブチルを含む農業の総使用回数

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数※	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稲	ノビエ キシウスズメノヒエ アゼガヤ	移植後20日～ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	100mℓ/10a	25～100ℓ/10a	本剤 2回以内 シハロホップブチル 3回以内	湛水散布または 落水散布
	ノビエ	移植後20日～ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで		0.8～1.6ℓ/10a		無人航空機 による散布
直播水稲	一年生イネ科雑草	は種後10日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで		25～100ℓ/10a		雑草茎葉散布または 全面散布
		は種後10日～ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで		0.8～1.6ℓ/10a		無人航空機 による散布

- 使用前には、ラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 防除日誌を記載しましょう。

取 扱：住友化学株式会社／日本農薬株式会社／日産化学株式会社／北興化学工業株式会社
 発行者：コルテバ・ジャパン株式会社

本資料は2022年11月現在の知見に基づき、作成されています。