



## 殺虫殺菌剤

# ビーム™エイトエクシード™ソル

Isoclast™ active

### 殺虫殺菌剤

(Beam™ Eight Exceed™ SOL)

農林水産省登録  
第 2 4 1 5 1 号



種類名／スルホキサフロル・トリシクラゾール水和剤  
有効成分の種類及び含有量／スルホキサフロル ……10.0%  
トリシクラゾール ……8.0%  
その他の成分の種類及び含有量／水、界面活性剤 等 ……82.0%  
物理的・化学的性状／淡黄赤色粘稠水和性懸濁液体  
毒劇法／該当なし  
消防法／該当なし  
有効年限／3年

包装／500ml×20本、5ℓ×4本 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

## 特長

- 新規の「スルホキシイミン系」殺虫成分、イソクラスト™含有剤です。
- 水稲で問題となる斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示します。
- トリシクラゾールは、メラニン合成を阻害する殺菌剤で、いもち病菌の進入を防ぎ安定した効果を発揮します。また、孢子形成阻害、孢子飛散防止による二次感染阻止効果が高く、発病後の散布でもその後の蔓延を抑制します。

## 適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及びスルホキサフロル、トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類	1000	60~150 ℓ /10a	収穫7日前まで	本剤：3回以内 スルホキサフロル：3回以内 トリシクラゾール：4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、 本田では3回以内)	散布
	ツマグロヨコ バイ カメムシ類	250	25 ℓ /10a			
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8	0.8 ℓ /10a			無人航空機による散布

## 上手な使い方

- 水稻の出穂期から乳熟期までの散布をおすすめします。  
(各地で推奨されている散布期間にしたがって使用してください)
- トリシクラゾールはいもち病に対して予防散布で高い効果がありますが、発病後の散布でもその後の蔓延を抑えます。  
 <葉いもち>発生が予想される場合、または発病をみたら、直ちに散布してください。  
 <穂いもち>穂ばらみ後期頃の散布が効果的です。多発生が予想される場合は穂ぞろい期頃追加散布をしてください。



## 使用上の注意



- 使用量に合わせて薬液を調製し、使い切ってください。
- 本剤は長時間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水等）等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤を本田の水稻に対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 無人航空機による散布に使用する際は、以下のことに注意してください。
  - ・ 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
  - ・ 微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
  - ・ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管とその他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ・ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないでください。
  - ・ 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体など）に対して、周辺で養蜂が行われて

いるかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチへの危害防止に努めてください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。



### 安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

**保管**…直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に密封して保管してください。