



殺菌剤

ビーム™ エイト ソル

水稲用殺菌剤

(Beam™ eight SOL)

農林水産省登録
第 17749 号



種類名／トリシクラゾール水和剤

有効成分の種類及び含有量／トリシクラゾール……………8.0%

その他の成分の種類及び含有量／界面活性剤、色素、水等 ……92.0%

物理的・化学的性状／淡黄赤色粘稠水和性懸濁液体

毒劇法／該当なし

消防法／該当なし

有効年限／3年

包装／5ℓ×4 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特長

- トリシクラゾールは、メラニン合成を阻害する殺菌剤で、いもち病菌の侵入を防ぎ安定した効果を発揮します。また、孢子形成阻害、孢子飛散防止による二次感染阻止効果が高く、発病後の散布でもその後の蔓延を抑制します。
- 浸透移行性に優れているので、稲の茎葉から速やかに吸収移行し、葉いもち、穂いもちを防ぎます。残効性が長く、また、散布後の降雨等による影響も少ないため、長期間安定した高い防除効果を示します。
- 本剤は、他剤と交差耐性を示さないため、他剤に耐性のいもち病菌に対しても高い防除効果を示します。
- 魚介類、カイコ、ハチ類、天敵類、鳥類に対して影響が少ない薬剤です。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当たり 使用液量	使用時期	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	使用方法
稲	いもち病	原液	150～200mℓ	収穫7日前 まで	本剤：3回以内 トリシクラゾール：4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、本田では 3回以内)	空中散布
		4～5	800mℓ			無人航空機による 散布
		5～8				空中散布
		15～20	3ℓ			散布
		250	25ℓ			
		1000	60～150ℓ			

上手な使い方

- 本剤は予防的な散布で高い効果がありますが、発病後の散布でもその後のいもち病の蔓延を抑えます。
 - <葉いもち> 発生が予想される場合、または発病をみたら、直ちに散布してください。
 - <穂いもち> 穂ばらみ後期頃の散布が効果的です。多発生が予想される場合は穂ぞろい期頃追加散布をしてください。



使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 本剤は長時間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから充分攪拌してください。
- 各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 微量散布及び少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
- 無人航空機による散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合した散布装置を使用してください。
- 散布薬液の飛散によって動植物特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水等）等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
- 作業終了後は次の項目を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。
 - ・機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。



安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管…直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管してください。