



除草剤

クリンチャー™ EW

水稲用除草剤 (Clincher™ EW)

農林水産省登録
第19195号

種類名／シハロホップブチル乳剤
有効成分の種類及び含有量／シハロホップブチル(PRTR1種)…30.0%
その他の成分の種類及び含有量／有機溶剤、界面活性剤、水等…70.0%
(内ナフタレン(PRTR1種)3%、メチルナフタレン(PRTR1種)9%)
物理的・化学的性状／類白色粘稠乳濁液体
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／5年
包装／100㎖×10本×3 ダンボール箱
500㎖×20本 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特長

- 水稲のノビエ防除剤です。茎葉散布で発芽後から6葉期までのノビエに高い効果を示します。
- 雑草の茎葉部から速やかに吸収され作用点へ移行し、殺草効果を発揮します。
- 効果の発現が比較的速く、黄化・褐変症状が現れた後枯死させます。
- 散布後の降雨や土質の違いによる効果への影響はほとんどありません。
- 湛水での散布でも高い効果を示します。
- イネとノビエ間の代謝分解速度の違いにより、イネに高い安全性を示します。
- 散布後は、環境中で速やかに分解され不活性化するので、稲わらや土壌への残留の心配はありません。
- ノビエのほか、キシウスズメノヒエ、アゼガヤにも効果があります。
- 直播水稲や、育苗箱、飼料米にも使用できます。

適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量		本剤及び シハロホップブチルを 含む農薬の総使用回数	使用方法
			薬量または 希釈倍数	希釈水量 または 使用液量		
移植水稻	ノビエ キシウスズメノヒエ アゼガヤ	移植後20日～ ノビエ6葉期 但し、収穫30日 前まで	100mℓ	25～100ℓ	本剤：2回以内 シハロホップブチル ：3回以内	湛水散布 又は 落水散布
直播水稻	水田一年生 イネ科雑草	播種後10日～ ノビエ5葉期 但し、収穫30日 前まで				
稲(箱育苗)	ノビエ	播種後10日～ ノビエ5葉期	1000倍	育苗箱 (30×60cm) 当り18mℓ	本剤：1回 シハロホップブチル ：3回以内	雑草茎葉散布

上手な使い方

- 散布時は展着剤を加用してください。
- 雑草の茎葉全体及び株元によく付着するように散布してください。
- 散布適期を越えると効果が劣るので、時期を失ないように散布してください。



使用上の注意

- 散布液は使用当日に調製してください。
- 本剤は乳濁性液体なので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。
- 本剤の使用の際は展着剤を加用してください。
- 本田内に再生するキシウスズメノヒエでは再生茎3～6葉期が本剤散布の適期です。また、畦畔より侵入するキシウスズメノヒエ防除では畦畔からのほふく茎1m以内の株全体に株元まで散布してください。
- アゼガヤには、草丈60cmまで有効なので、時期を失ないように散布してください。
- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。
- 落水条件で散布する際は、撒きむらがないように均一に散布してください。
- 湛水条件で散布する際は、原液散布では効果がないので、散布液を使用当日に調製し、水の出入

りを止めて湛水のまま均一に雑草茎葉散布してください。少なくとも3～4日間は通常の湛水状態（水深3～5cm程度）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

- 漏水田（減水深2cm/日以上）では葉害が発生するおそれがあるので使用しないでください。
- 少水量散布（25～50ℓ/10a）には専用ノズルを使用してください。
- 本剤はとうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物及びキャベツの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合にはかからないよう十分注意してください。また、散布田の水田水をこれらの作物に灌水しないようにしてください。
- 乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合がありますので注意してください。特に、乾田直播水稲に使用する場合は注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や、異常気象時は、病虫害防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また、空容器は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。



安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。

水産動植物…水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。本剤を使用した苗は、養魚田には移植しないでください。

保管…直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。