



殺 虫 剤

デリゲート™ WDG

園芸用殺虫剤 (Delegate™ WDG)

農林水産省登録
第 2 4 2 3 1 号



種類名／スピネトラム水和剤
有効成分の種類及び含有量／スピネトラム……………25.0%
その他の成分の種類及び含有量／界面活性剤、鋳物質微粉 等…75.0%
物理的・化学的性状／類白色水和性細粒
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／3年
包装／100g×10本×2
100g×10袋×2

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特 長

- チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し優れた防除効果を発揮します。
- ハマキムシ類の各ステージ（卵、幼虫、成虫）に対し、優れた防除効果を発揮します。
- 登録作物すべてで、収穫前日まで使用可能です。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤及びスピネトラムを 含む農薬の総使用回数	使用 方法
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5000～10000	200～700 ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ	5000～15000				
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類	5000～10000				
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類					
ずもも	シンクイムシ類					
ぶどう	ハスモンヨトウ	5000				
	アザミウマ類 ハマキムシ類	10000				
かき	アザミウマ類 ハマキムシ類 カキノヘタムシガ	5000～10000				
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類					
	ハスモンヨトウ					
くり	モモノゴマダラノメイガ	5000				
いちじく	アザミウマ類	5000				
	ショウジョウバエ類	10000				
うめ	ケムシ類	5000～10000				
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ					
さんしょう(果実)	アザミウマ類					
アロニア	シンクイムシ類	10000				



使用上の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特にはじめで使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめで使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。
 - ・ ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・ 受粉促進を目的としてミツバチなどを放飼中の施設や果樹園などでは、使用をさけてください。
 - ・ 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体など）に対して、周辺で養蜂が行われているか確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチへの危害防止に努めてください。

保管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。