



殺 虫 剤

ダブルシューター™ SE

園芸用殺虫剤
(doubleshooter™ SE)

農林水産省登録
第 24055号



種類名／脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤
有効成分の種類及び含有量／スピノサド……………5.0%
脂肪酸グリセリド……………75.0%
その他の成分の種類及び含有量／水、界面活性剤 等……………20.0%
物理的・化学的性状／淡黄色水和性粘稠懸濁液体
毒劇法／該当なし
消防法／第4類第4石油類
有効年限／4年
包装／500ml×20本 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特
長

- コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類の同時防除が可能。
- 全生育ステージ（卵・幼虫・成虫）のコナジラミ類に優れた効果。
- 薬剤感受性の低下したハダニ類にも有効。
- 有効成分（スピノサド・脂肪グリセリド）単独使用では低活性の害虫も、2成分の相乗効果で優れた活性と安定した効き目。
- 収穫前日まで使用可能（花き類・観葉植物を除く）。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用液量	使用時期	使用方法	本剤および スピノサドを含む農薬の 総使用回数
なす	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ	1000倍 100~300 ℓ / 10a	収穫前日まで	散布	2回以内
トマト ミニトマト	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ				
花き類・観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類		発生初期		

青文字の作物名はグループ化されていますので詳細は(独)農林水産消費安全技術センターのウェブサイトをご参照ください

上手な使い方

- 所定の濃度に水でうすめ、よくかきまぜて散布してください。
- 卵・幼虫・成虫と全成育ステージのコナジラミ類防除に効果を発揮するので、トマトの生育にあわせた防除計画を組むことが可能です。



使用上の注意



- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないようにていねいに散布してください。
- キャブタン水和剤およびストロビルリン系薬剤との同時施用及び近接散布は、薬害を生じる恐れがあるのでさけてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれがある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチへの危害防止に努めてください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめで使用する場合には、病虫害防除所など関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

引火性…危険物第四類第四石油類に属するので、火気には十分注意してください。

保管…直射日光をさけ、低温な場所に密封して保管してください。