



殺 菌 剤

エクシード™ 粉剤DL

Isoclast™ active

水稲用殺虫剤
(Exceed™ DL)

農林水産省登録
第24140号



種類名／スルホキサフロル粉剤
有効成分の種類及び含有量／スルホキサフロル……………0.5%
その他の成分の種類及び含有量／鋳物質微粉 等……………99.5%
物理的・化学的性状／類白色粉末 45µm以下 浮遊性指数20以下
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／3年

包装／3kg×8袋 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特 長

- 新規の「スルホキシイミン系」殺虫剤です。
- 水稲で問題となる斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示します。
- 散布回数は3回まで、収穫7日前まで使用できます。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当たり 使用用量	使用時期	本剤及び スルホキサフロルを 含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3kg	収穫7日前 まで	3回以内	散布

上手な使い方

- 水稲の出穂期から乳熟期までの散布をおすすめします。
(各地で推奨されている散布期間にしたがって使用してください)
- 害虫の薬剤抵抗性管理のため、他の作用機構を持つ殺虫剤と組み合わせてのローテーション散布をおすすめします。



使用上の注意



- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体など）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチへの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特にはじめで使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物**…水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
 - 散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管**…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。