



殺虫剤

ファルコンTMフロアブル

園芸用殺虫剤

(FalconTM SC)

農林水産省登録
第20676号



種類名／メトキシフェノジド水和剤
有効成分の種類及び含有量／メトキシフェノジド……………20.0%
その他の成分の種類及び含有量／水、界面活性剤 等……………80.0%
物理的・化学的性状／淡褐色水和性粘稠懸濁液体
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／5年

包装／125mL×10本×4 ダンボール箱
250mL×20本 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

特長

- メトキシフェノジドは、脱皮促進作用を持つ成分で、チョウ目害虫に対し食毒による脱皮促進作用で異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。
- ユニークな作用機作により、既存の薬剤抵抗性害虫にも効果を示します。
- 残効性・耐雨性に優れており、幼虫の発育令にかかわらず安定した効果を示します。
- 多くの有用昆虫、天敵類、鳥類への影響が少なく、作物や人畜に対する優れた安全性から、IPM（総合的害虫管理）防除に適しています。
- ミツバチ・マルハナバチは0～1日後に導入できます。蚕に対する安全日数は60日です。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤及びメト キシフェノジド を含む農薬の 総使用回数	使用 方法	
りんご	ハマキムシ類	4000~6000	200~700 ℓ	収穫21日前まで	3回以内	散布	
	ケムシ類 ヨモギエダシヤク	6000					
	キンモンホソガ	2000					
おうとう もも	ハマキムシ類	6000	200~700 ℓ	収穫3日前まで	散布		
なし	ケムシ類 ハマキムシ類			収穫前日まで			
キャベツ	コナガ	1000	150~300 ℓ	収穫7日前まで			2回以内
	アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウフバ	2000~4000					
	オオタバコガ	2000					
	ハイマダラノメイガ	4000					
	はくさい						
だいごん	ヨトウムシ	100~300 ℓ	収穫3日前まで	3回以内			
ブロッコリー	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	4000	150~300 ℓ	収穫前日まで		2回以内	
はなっこりー	ハスモンヨトウ		150~180 ℓ				
つるな					収穫3日前まで		
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000~4000	100~300 ℓ	収穫前日まで	3回以内		
ピーマン なす トマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
ししとう	ハスモンヨトウ オオタバコガ					4000 2000	2回以内
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000~4000	150~300 ℓ	収穫3日前まで			
非結球レタス	オオタバコガ	4000	100~300 ℓ				
食用ぎく	ハスモンヨトウ		200 ℓ	収穫7日前まで			
食用金魚草			150~200 ℓ	収穫3日前まで			
食用なでしこ		100~300 ℓ					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	4000	150~200 ℓ	収穫前日まで	2回以内		
ふき	ハスモンヨトウ						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	4000~6000	100~300 ℓ	収穫3日前まで	3回以内		
食用なでしこ	ハスモンヨトウ	4000	100~150 ℓ	収穫2日前まで	2回以内		
はすいも(葉柄)		2000		収穫前日まで			

青文字の作物名はグループ化されていますので詳細は(独)農林水産消費安全技術センターのウェブサイトをご参照ください

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤及びメト キシフェノジド を含む農薬の 総使用回数	使用 方法
てんさい	ヨトウムシ	4000~6000	100~150ℓ	収穫7日前まで	3回以内	散布
茶	チャハマキ	4000	200~400ℓ	摘採7日前まで	2回以内	
	チャノホンガ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク	4000~8000				
	ハスモンヨトウ	8000				

上手な使い方

- 本剤は植物体上での移行性はありません。害虫発生初期に葉裏までむら無く付着するよう十分量を散布してください。
- 抵抗性回避のため、ハマキムシ類、その他のチョウ目害虫への連続散布はさけ、ラベルの使用回数内であっても、必要があれば作用機作の違う剤とのローテーションを病害虫防除指導関係機関とご相談ください。



使用上の注意



- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめに使用する場合には、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水などは、河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

保管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。