



殺 虫 剤

ビレスコ™ 顆粒水和剤

Isoclast™ active

畑作用殺虫剤
(viresco™ WG)

農林水産省登録
第24137号



種類名／スルホキサフロル水和剤
有効成分の種類及び含有量／スルホキサフロル……………25.0%
その他の成分の種類及び含有量／鋳物質微粉 等……………75.0%
物理的・化学的性状／類白色水和性細粒
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／5年

包装／100g×10×2袋 ダンボール箱
500g×10袋 ダンボール箱

TM®：コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

特 長

- スルホキシイミン系の新規殺虫剤です。
- 現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。
- 幅広い種類のアブラムシ類（20種以上）に対して、卓越した効果を発揮します。
- 浸透移行性と浸達性により葉裏や莖葉にも成分がおよぶため、一定期間防除効果が期待できます。
- 速効性があります。
- 散布後すぐにストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下し死亡します。
- 薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。

適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用液量	使用時期	使用方法	本剤および スルホキサフロルを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	5000~10000倍 100~300 ℓ /10a	収穫7日前まで	散布	3回以内
		1250倍 25 ℓ /10a			
てんさい		5000~10000倍 100~300 ℓ /10a			

上手な使い方

- 浸透移行性には優れますが、葉裏までむらなく付着するように十分量を散布ください。
- 抵抗性回避のため、作用性の異なる殺虫剤とのローテーション防除に心がけてください。



使用上の注意



- 本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。
 - ・ ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - ・ 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・ 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体など）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチへの危害防止に努めてください。
- ばれいしょに対して希釈倍数1250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 散布器具および容器の洗浄水などは河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないように適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時および散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

水産動植物…使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。

- ・散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。