



殺菌剤

ゾーベック™エンカンティア™

SE

園芸用殺菌剤

(Zorvec™ Encantia™)

農林水産省登録
第24254号



種類名／オキサチアピプロリン・ファモキサドン水和剤

有効成分の種類及び含有量／オキサチアピプロリン(通称：ゾーベック)……………2.8%

ファモキサドン……………28.0%

その他の成分の種類及び含有量／水、界面活性剤等……………69.2%

物理的・化学的性状／類白色水和性粘稠懸濁液体

毒劇法／該当なし

消防法／該当なし

有効年限／3年

包装／250ml×20本 ダンボール箱
12×12本 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

地域によってお取り扱いが無い場合があります

特 長

- 2種類の有効成分の働きで、従来の薬剤に対して感受性の低下したべと病菌や疫病菌にも有効です。
- 浸透移行性があるため新葉を守ります。
- 耐雨性と残効性に優れています。
- 病原菌生活環における様々なステージに効果があり、予防効果に優れます。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量	使用時期	本剤及びオキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数	ファモキサドンを含む農薬の総使用回数	使用方法
ばれいしょ	疫病	2000	100~300ℓ	収穫14日前まで	2回以内	4回以内	散布
		500	25				
レタス	べと病	4000	100~300ℓ	収穫7日前まで		2回以内	
非結球レタス				収穫14日前まで		3回以内	
はくさい							

青文字の作物名はグループ化されていますので詳細は(独)農林水産消費安全技術センターのウェブサイトをご参照ください

上手な使い方

- 栽培期間の前半に使用してください。防除の序盤に使用することで本剤の特徴である高い効果が発揮され耐性菌発達リスクを下げることが可能です。疫病・べと病の発生が予想される場合に予防的に使用してください。
- 7~10日後には次の疫病・べと病防除剤を散布してください。



使用上の注意

- 使用前によく振って、薬液が十分懸濁されていることを確認してから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- アルカリ性農薬との混用はさけてください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- 散布にあたっては、風向きなどに注意し、薬液が周辺の作物に飛散してかからないように十分注意してください。
- 過度の連用をさげ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- 耐性菌管理の観点から、地床育苗または殺菌していない培土での育苗では使用しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ばれいしょに対して希釈倍数500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物…使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に密栓して保管してください。