



殺菌剤

ゾーベック™ エニベル™ 顆粒水和剤

園芸用殺菌剤
(Zorvec™ Enibel™)

農林水産省登録
第 2 4 2 5 6 号



種類名／オキサチアピプロリン・マンゼブ水和剤
有効成分の種類及び含有量／オキサチアピプロリン(通称：ゾーベック)……0.60%
マンゼブ(PRTR1種)……60.0%
その他の成分の種類及び含有量／分散剤等 ……39.4%
物理的・化学的性状／暗黄色水和性細粒及び微粒
毒劇法／該当なし
消防法／該当なし
有効年限／3年
包装／667g×10袋 ダンボール箱

TM：デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標

地域によってお取り扱いが無い場合があります

特長

- 2種類の有効成分の働きで、従来の薬剤に対して感受性の低下したべと病菌や疫病菌にも有効です。
- 浸透移行性があるため新葉を守ります。
- 耐雨性と残効性に優れています。
- 病原菌生活環における様々なステージ効果があり、予防効果に優れます。
- トマトときゅうりでは収穫前日まで使用可能です。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤及び オキサチアピプロリンを含む 農薬の総使用回数	マンゼブを含む 農薬の総使用回数	使用方法
トマト	疫病	750	100～300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	散布
きゅうり	べと病			3回以内			
ぶどう	晩腐病		200～700ℓ	収穫45日前 まで		2回以内	

上手な使い方

- 栽培期間の前半に使用してください。防除の序盤に使用することで本剤の特徴である高い効果が発揮され耐性菌発達リスクを下げることが可能です。疫病・べと病の発生が予想される場合に予防的に使用してください。
- 7～10日後には次の疫病・べと病防除剤を散布してください。



使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- ボルドー液との7日以内の近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- ぶどうで使用する場合、果実肥大中期（あずき大）以降の散布においては、果粉の溶脱が生じることがあるので十分注意してください。
- 散布にあたっては、風向きなどに注意し、薬液が周辺の作物に飛散してかからないように十分注意してください。
- 過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせで使用してください。
- 空容器、空袋等は圃場などに放置せず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 耐性菌管理の観点から育苗期間中は本剤を使用しないでください。



安全使用上の注意



- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場

合は、直ちに石けんでよく洗い落してください。

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣の作業衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物…使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。